

精巣癌

レジメン名	使用薬剤		制吐薬	インターバル日数
	注射薬	内服薬		
PTX/CBDCA	パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン(day1)、アプレピタント、デキサメタゾン(day1-3)	21日
CBDCA	カルボプラチン		グラニセトロン(day1)、デキサメタゾン(day1-3)	21日
BEP	エトポシド、シスプラチン、ブレオマイシン		パロノセトロン(day1)、アプレピタント、デキサメタゾン(day1-5)	21日
VIP	シスプラチン、エトポシド、イホスファミド		パロノセトロン(day1)、アプレピタント、デキサメタゾン(day1-5)	21日
TIP	パクリタキセル、シスプラチン、イホスファミド		パロノセトロン(day2)、アプレピタント(day2-5)、デキサメタゾン(day1-5)	21日
VeIP	シスプラチン、ビンブラスチン、イホスファミド		パロノセトロン(day1)、アプレピタント、デキサメタゾン(day1-5)	21日
CPT/NDP	イリノテカン、ネダプラチン		グラニセトロン(day1)、デキサメタゾン(day1-3,15-17)	28日
GEM/オキサリプラチン	ゲムシタビン、オキサリプラチン		グラニセトロン(day1)、デキサメタゾン(day1-3,8)	21日
エトポシド/シスプラチン	エトポシド、シスプラチン		パロノセトロン(day1)、アプレピタント、デキサメタゾン(day1-5)	21日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。