

## 卵巣癌

レジメン名	使用薬剤 注射薬	内服薬	制吐薬	インターバル日数
オラパリブ		オラパリブ		連日
GEM	ゲムシタビン		デキサメタゾン(注射投与日)	28日
Peg-DXR	ドキシソルピシン(リポソーム封入製剤)		デキサメタゾン(注射投与日)	28日
ペバシズマブ	ペバシズマブ			21日
ノギテカン	ノギテカン		デキサメタゾン(注射投与日)	21日
ドセタキセル	ドセタキセル		デキサメタゾン(注射投与日)	21日
イリノテカン	イリノテカン		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	28日
CPT/NDP	イリノテカン、ネダプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	28日
5FU		フルオロウラシル		連日
wPTX	パクリタキセル		デキサメタゾン(注射投与日)	7日
Peg-DXR/BEV	ドキシソルピシン(リポソーム封入製剤)、ペバシズマブ		デキサメタゾン(注射投与日)	28日
シスプラチン	シスプラチン		パロノセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	21日
DOC/CBDCA	ドセタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	21日
TC(PTX/CBDCA)	パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	21日
カルボプラチン	カルボプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	21日
wPTX/CBDCA	パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間、パクリタキセル投与日)	21日
Peg-DXR/CBDCA	ドキシソルピシン(リポソーム封入製剤)、カルボプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	28日
BEV/PTX/CBDCA	ペバシズマブ、パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	21日
CPT/CDDP	イリノテカン、シスプラチン		パロノセトロン(注射投与日)、アプレピタント(注射投与日～3日間)、ノギテカン(注射投与日～3日間)	28日
PTX/CDDP	パクリタキセル、シスプラチン		パロノセトロン(注射投与日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～3日間)	21日
BEP	エトポシド、シスプラチン、プレオマイシン		パロノセトロン(注射投与初日)、アプレピタント、デキサメタゾン(注射投与日～5日間)	21日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。