脳腫瘍

レジメン名	使用薬剤		制吐薬	インターバル日数
	注射薬	内服薬		
テモゾロミド 初発 RT併用		テモゾロミド(42日間内服)、放射線療法併用		70日
テモゾロミド 単独		テモゾロミド(5日間内服)		28日
Bev/テモゾロミド 初発 RT併用	ベバシズマブ	テモゾロミド(42日間内服)、放射線療法併用		70日
Bev/テモゾロミド 単独	ベバシズマブ	テモゾロミド(5日間内服)		28日
Bev 単独療法期	ベバシズマブ			21日
Bev 再発	ベバシズマブ			14日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。
抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。
必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。
薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。