

# 血液がん

レジメン名	使用薬剤 注射薬	内服薬	制吐薬	インターバル日数
イマチニブ		イマチニブ		連日
ダサチニブ		ダサチニブ		連日
ニロチニブ		ニロチニブ		連日
ボスチニブ		ボスチニブ		連日
ボナチニブ		ボナチニブ		連日
ギルテリチニブ		ギルテリチニブ		連日
キザルチニブ		キザルチニブ		連日
ヒドロキシカルバミド		ヒドロキシカルバミド		連日
トレチノイン		トレチノイン		連日
スタラシド		スタラシド(21日間内服)		35日
ルキソリチニブ		ルキソリチニブ		連日
イブルチニブ		イブルチニブ		連日
ATLL レナリドミド		レナリドミド		連日
エトボシド A法		エトボシド(5日間内服)		26日
エトボシド B法		エトボシド(21日間内服)		28日
フォロデシン		フォロデシン		連日
R-MPV	リツキシマブ、メトレキサート、ピンクリスチン	プロカルバジン(奇数コースのみ7日間内服)	パロノセトロン(メトレキサート投与日)	14日
サリドマイド		サリドマイド		連日
レナリドミド/デキサメタゾン		レナリドミド(21日間内服)		28日
ボマリドミド/デキサメタゾン		ボマリドミド(21日間内服)		28日
IRD		イマチニブ(連日)、ニロチニブ(連日)、ボスチニブ(連日)、ボナチニブ(連日)、ギルテリチニブ(連日)、キザルチニブ(連日)、ヒドロキシカルバミド(連日)、トレチノイン(連日)、スタラシド(21日間内服)		28日
MPB	ボルテゾミブ	メルファラン(4日間内服)		35日
DRC	リツキシマブ	シクロホスファミド(5日間内服)		21日
VRD(28日)	ボルテゾミブ	レナリドミド(21日間内服)		28日
VRD(21日)	ボルテゾミブ	レナリドミド(14日間内服)		21日
KRd	カルフィルゾミブ	レナリドミド(21日間内服)		28日
DLd	ダラツムマブ	レナリドミド(21日間内服)		28日
エロツムマブ/Ld	エロツムマブ	レナリドミド(21日間内服)		28日
PVD	ボルテゾミブ	ボマリドミド(21日間内服)		28日
エロツムマブ/Pd	エロツムマブ	ボマリドミド(21日間内服)		28日
パノビノスタット/VD	ボルテゾミブ	パノビノスタット(1, 3, 5, 8, 10及び12日目)		21日
DMPB	ダラツムマブ、ボルテゾミブ	メルファラン(4日間内服)		42日
アザシチジン	アザシチジン		パロノセトロン(注射投与初日)もしくはラモセトロン(注射投与日)	28日
CHOP	ピンクリスチン、ドキシロピシン、シクロホスファミド	プレドニゾン(注射投与日～5日間)	パロノセトロン(注射投与初日)	21日
BR	リツキシマブ、ベンダムスチン		パロノセトロン(ベンダムスチン投与初日)	28日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。